

VOLET INTERNE RECTO (SIDE 7)

**ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ** Μαρούλι, Σπανάκι, Λικοτρίβολο, Ρόκα, Κάρδαμο, Σέσκουλα (Υπαίθρου): Για την καταπολέμηση του Βοτρώτη και της Σκληρωτινιάσης.

**Δόση:** 150 κ.εκ./στρ.  
**Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από το στάδιο της έκπτυξης του 10% των φύλλων έως την συγκομιδή.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο:** 1.

**ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Βοτρώτη.  
**Δόση:** 100-200 κ.εκ./στρ. (1η εφαρμογή) και 200-300 (2η εφαρμογή).

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 κ.εκ σκευ./στρ.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο:** 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Ροδάκινα, Βερίκοκα: Για την καταπολέμηση της Μονίλιας. **Δόση:** 120 κ.εκ./στρ.

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. Για την καταπολέμηση της Μονίλιας συνίσταται 1 εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Για την καταπολέμηση του Ωιδίου.

**Δόση:** 150 κ.εκ./στρ.  
**Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. Για την καταπολέμηση του Ωιδίου, συνίσταται 1 εφαρμογή από την καρπόδεση έως το 90% της ωρίμανσης των καρπών.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο:** 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

**ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου / Θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Βοτρώτη.  
**Δόση:** 90 κ.εκ./στρ.

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων ανθικών καταβολών στη βάση της ροζέτας μέχρι την συγκομιδή. Η συνιστώμενη δόση είναι 90 κ.εκ.σκευ./στρ. ανά εφαρμογή. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 180 κ.εκ.σκευ./στρ.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο:** 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες.

**Παρατηρήσεις:**

**1.** Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού και τους εξοπλισμούς διανομής που χρησιμοποιούνται, συνιστάται να τηρείτε τις ελάχιστες και μέγιστες δόσεις προϊόντος / στρέμμα που αναφέρονται.

(SIDE 1)

**2.** Τομάτα-μελιτζάνα, Αγγούρι-Κολοκύθι(θερμοκηπίου), Πιπεριά: Η συνολική δόση ανά καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 400κ.εκ/στρ.

**3.** Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκάσμός φυλλώματος.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες):**

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: **21.**  
ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Υ), ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υ+Θ), ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ), ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ): **1.**  
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ που περιλαμβάνονται στο φάσμα δράσης (Υ): **14.**  
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινα, Βερίκοκα): **3.**

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ**

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

FACE CACHÉE RECTO (SIDE 2)

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**  
**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το CLAVIER 20 SC περιέχει renthiopyrad, δραστική ουσία που ανήκει στη χημική ομάδα των καρβοξαμιδίων (ομάδα C2 κατά FRAC). Το renthiopyrad ανήκει στην ομάδα των παρεμποδιστών του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (SDHI). Για να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση ανθεκτικότητας, συνιστάται να υιοθετήσετε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

- Το CLAVIER 20 SC πρέπει να εφαρμόζετε προληπτικά.
- Τηρείτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών CLAVIER 20 SC ανά έτος (2 για το μήλο και το αχλάδι, 1 για τα κηπευτικά).

- Για τη μηλιά και την αχλαδιά μην πραγματοποιείτε πάνω από 4 εφαρμογές ανά έτος με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με το renthiopyrad.
- Για τα κηπευτικά εφαρμόστε αυστηρά εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 1 ώρα πριν βρέξει.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκης αποθήκευσης:** Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκάστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**Κ-44981/2002 - GREECE**

**ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**  
**ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**  
**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

(SIDE 3)

**FACE PRINCIPALE RECTO (SIDE 4)**

**(SIDE 5)**

**VOLET PRINCIPAL RECTO (SIDE 6)**

**Μυκητοκτόνο επαφής και διεισδυτικό ευρέως φάσματος με προστατευτική και θεραπευτική (στο Φουζικλάδιο στα αρχικά στάδια της ασθένειας) δράση.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

A.A.Δ.A.: 60946/01.04.2020

**Κάτοχος της άδειας:**

**NTY PONT ELLAS A.E.**

Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232-Χαλάνδρι

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι

Τηλ.: 213 006 5070

**Κ-44981/2002 - GREECE**

**ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**  
**ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**  
**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**



**Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

**Penthiopyrad**

Εγγυημένη σύνθεση: **Penthiopyrad 20 % β/ο**

**Βοηθητικές ουσίες: 79,2 % β/β**

Περιεχόμενο: **750 ml e**

® TM Σήμα κατατεθέν της E.I.Du Pont de Nemours & Co. (Inc.).

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΜΗ ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων μην εφαρμόζετε σε εδάφη με περιεκτικότητα άμμου μεγαλύτερη του 80%.

Για να προσταφέτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης:

- 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και των πυρηνόκαρπων.

- 18 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας, της πιπεριάς, της μελιτζάνας, του αγγουριού και του κολοκυθού (υπαίθρου και θερμοκηπίου).

- 10 μέτρων για τις καλλιέργειες της φράουλας και των φυλλωδών λαχανικών.

09/04/2020 12:25

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

## VOLET PRINCIPAL VERSO (SIDE 8)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:**

Το σκεύασμα είναι ευδιάλυτο στο νερό και δεν απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Αφού θα έχετε γεμίσει περίπου το ένα τρίτο της χωρητικότητας της δεξαμενής του ψεκαστήρα, αδειάστε την επιθυμητή ποσότητα CLAVIER 20 SC απευθείας στη δεξαμενή, διατηρώντας σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Διενεργήστε τον ψεκασμό υπό ανάδευση.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε όλο το ψεκαστικό μηχανήμα με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού του βυτίου δύο ακόμα φορές. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Μυκητοκτόνο επαφής και διεισδυτικό ευρέως φάσματος με προστατευτική και θεραπευτική (στο Φουζικλάδιο στα αρχικά στάδια της ασθένειας) δράση. Το CLAVIER 20 SC αναστέλλει την αναπνοή των μυκήτων συνδεδεμένο με το μιτοχονδριακό αναπνευστικό σύμπλεγμα II.

Η δραστική του ουσία σταματά τη βλάστηση των σπορίων, την δημιουργία νέων σπορίων και αναστέλλει την ανάπτυξη του μυκηλίου.

### **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

**ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ:** Για την καταπολέμηση των: Φουζικλάδιο, Ωίδιο, Αλτερνάρια και Στεμφύλιο. Δόση: 112.5\* κ.εκ./στρ.

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150\* λίτρα/στρ. Εφαρμογή όταν αναμένεται εμφάνιση της ασθένειας από το άνοιγμα των πρώτων φύλλων έως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

\*Σε περίπτωση εφαρμογών έως το τέλος της ανθοφορίας, χρησιμοποιήστε όγκο νερού 100-120 λίτρα/στρ. (75-90 ml προϊόν/στρ.)

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος:** 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

## VOLET INTERNE VERSO (SIDE 9)

**ΤΟΜΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ (Υπαίθρου):** Για την καταπολέμηση του Βοτρώτη. Δόση: 240 κ.εκ./στρ.

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-120 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Ελάχιστη δόση 200 κ.εκ. ανεξαρτήτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος:** 1.

**ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ (Θερμοκηπίου / προστατευόμενα):** Για την καταπολέμηση του Βοτρώτη. Δόση: 240 κ.εκ./στρ max (για μία εφαρμογή) 400 κ.εκ./στρ. max (για 2 εφαρμογές).

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-120 λίτρα/στρ.

Εφαρμογή από την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 ml/στρ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν στη 2η εφαρμογή γίνει επέμβαση με 120 λίτρα/στρ στην 1η θα πρέπει να γίνει επέμβαση με 80 λίτρα/στρ. Η δόση 200 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού παραμένει σταθερή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος:** 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες.

**ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (με βρώσιμο φλοιό): Κολοκύθι, Αγγούρι (Θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Ωιδίου. Δόση: 240 κ.εκ./στρ.

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-120 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εμφάνιση των ανθέων στον

κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος:** 1.

**ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (με βρώσιμο φλοιό): Κολοκύθι, Αγγούρι (Θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Ωιδίου. Δόση: 100 κ.εκ./στρ (1η εφαρμογή) και 300 κ.εκ./στρ. (2η εφαρμογή).

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 κ.εκ σκευ./στρ.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος:** 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες.