

EU 413 PAGO

275mm

127mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επκέτα. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Μη δίνετε υγρά και μη προκαλείτε εμετό αν ο παθόντας είναι αναισθητός ή έχει σπασμούς.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα βρεγμένα με το σκεύασμα ρούχα. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210.7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρθούν άμεσα μόνο ανοιζιάτικο κριθάρι, ανοιζιάτικο ατάρι, ανοιζιάτικη βρώμη, αραβόσπορος ή σίκαλη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 15 ημέρες

Ειδικές συνθήκες, γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Για την αποφυγή ζημιών σε γεωτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30°C.
- Προσοχή στο θεριζοσάλινισμο υπό συνθήκες αυξημένης υγρασίας.
- Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμμόδη εδάφη και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό πριν τον ψεκασμό. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Το ψεκαστικό να μη στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε εδάφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκεύασμα Ριμτα Super 50 EW, Τορικό και Assert σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας τους.

Συνθήκες αποθήκευσης- χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, σε κανονικές θερμοκρασίες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Dow Dow AgroSciences

Mustang™ 306 SE

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Florasulam 0,625 % β/ο + 2,4 D ester 45,25 % β/ο (φλορασουλάμ + 2,4 D εστέρας)

Εναιώρημα σε γαλάκτωμα

Εγγυημένη σύνθεση: florasulam: 0,625% β/ο
2,4D ethyl-hexyl-ester: 45,25% β/ο (30% β/ο ισοδύναμο οζύ)
βοηθητικές ουσίες: 54,57 % β/β

Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

7677/21-11-2006 έως 31-12-2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 0,8 Λίτρα

Ημ. Παρασκευής/ Ημ Λήξης/ Αρ. Παρτίδας (βλέπε άνω μέρος της φιάλης):

Κάτοχος έγκρισης-Υπεύθυνος τελικής συσκευασίας και σήμανσης:
Dow AgroSciences Export S.A.S, Γαλλία

Εργοστάσιο παρασκευής- συσκευασίας σκευάσματος: Dow AgroSciences S.A., Γαλλία
Υπεύθυνος Επικοινωνίας- Διανομέας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 2106726381

®™Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο. Το florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών-σουλφονιδίων. Αναστέλλει τη δράση του ένζυμου οξείκογλακτικής συνθετάσης (acetolactate synthase-ALS). Το 2,4 D ανήκει στην ομάδα των φαινοξυακονοϊκών οξέων. Συσσωρεύεται κυρίως στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών στους σποίσιους και δρυς.

Φάσμα δράσης (πεδίο εφαρμογής, στάχος, δόσεις σκευάσματος, όγκος ψεκαστικού υγρού, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο):

Σιτάρι, κριθάρι: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων* με δόση 60-80 κ.εκ./ στρέμμα, ανάλογα με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/ στρέμμα. Μια μόνο μεταφωτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος του σταριού έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.

Αραβόσιτος: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων** με δόση 75 κ.εκ./ στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/ στρέμμα. Μια μόνο μεταφωτρωτική εφαρμογή έως το στάδιο του πρώτου κόμβου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-12 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.

Καταπολεμώμενα ζιζάνια:

***Σιτάρι, κριθάρι:** Κολλητοίδα (*Gallium spurium*, *G. aparine*), Παπαρούνα (*papaver rhoeas*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Ροπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Άδωνις (*Adonis aestivalis*) και Μπιφόρα (*Bifora radians*).

****Αραβόσιτος:** Τα παραπάνω καθώς και τα Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγροστοματά (*Solanum nigrum*), αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*) και Ασπράγκαθο (*Xanthium spinosum*).

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:


Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν έχει εφαρμογή

Αραβόσιτος: 15 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ζέπλυμα (τα νερά του ζέπλματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



P 0 0 2 1 3 4 9 4 0 6



<p>SCHAWK! Tel: (0044) 191 4917777</p>	<p>Package MID : 213494 06</p> <p>Trade Name : MUSTANG 306SE</p> <p>Country : GREECE</p> <p>Region : Eufrasia SG</p> <p>Size : 275x127mm</p> <p>Artwork Type : 0.8L PET BOTTLE FLAT</p> <p>Label Support : PET</p>	<p>Specification : EU 413</p> <p>Standardisation Level : 2</p> <p>Printer : PAGO</p> <p>Packing Location : DRUSENHEIM</p> <p>Level 70 Code : N/A</p> <p>Operator Initials : AS</p>	<p>COLOUR REFERENCES</p> <p>Number of Colours used: 4</p> <p>Cyan Magenta Yellow Black</p>	<p>QUALITY CHECK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MANUAL</p> <p><input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE</p> <p><input type="checkbox"/> DOCU PAGE</p>
	<p>362345A01/228294 Date:7-JAN-13 Issue : A</p>			