

BASF
We create chemistry

Polyram® WG

Metiram (μετιράμ)
Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

**Οργανικό μυκητοκτόνο
με προστατευτική
δράση κατά διαφόρων
μυκητολογικών
ασθενειών.**

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 60316/4-4-2012

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Περιεχόμενο: **1 kg**

® = Σήμα κατατεθέν BASF

81136633 GR 1099



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

«Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή».

«Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής».

«Οι εργατές θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαίρεστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία ασφαλή ζώνη προστασίας **30 μέτρων** για τα μηλοειδή και **5 μέτρων** για το αμπέλι από τα επιφανειακά ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Προλαβαίνει την ανάπτυξη της ασθένειας καταπολεμώντας το μύκητα κατά τη διάρκεια του σταδίου της εκβλάστησης των σπορίων πριν να εισχωρήσει στο φυτικό ιστό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ (αναφέρονται σε γραμμάρια σκευάσματος):

ΜΗΛΙΑ: Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Φουζικλάδιου (*Venturia inaequalis*)**. **Δόση:** 133 – 250 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης

κορυφής, της ρόδινης κορυφής και μετά την άνθηση. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες επανάληψη των ψεκασμών κάθε 7 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80 – 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** μέχρι 3

εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα: 200 γρ. *

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περωνόσπορου (*Plasmopara viticola*)**. **Δόση:** 160 – 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί που ξεκινούν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. (5 φύλλα). Οι ψεκασμοί συνεχίζονται μέχρι και το στάδιο της ανάπτυξης των ραγών και όχι αργότερα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περωνόσπορου (*Phytophthora infestans*)** **Δόση:** 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περωνόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*)**. **Δόση:** 180 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΠΕΠΟΝΙ (υπαίθρου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περωνόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*)**. **Δόση:** 180 – 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περωνόσπορου (*Bremia lactucae*)**. **Δόση:** 120 – 200 γρ./στρέμμα. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΠΑΤΑΤΑ: Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περωνόσπορου (*Phytophthora infestans*)** **Δόση:** 180 γρ./στρέμμα. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

* Ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο όγκο ψεκαστικού, η μέγιστη δόση σκευάσματος/στρέμμα δεν θα πρέπει να ξεπερνιέται.

- Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των πολυετών καλλιεργειών. Γενικά πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά: 21 ημέρες

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 56 ημέρες

Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 7 ημέρες

Αγγούρι (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Πεπόνι (υπαίθρου): 3 ημέρες

Μαρούλι (υπαίθρου), Πατάτα: 14 ημέρες

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες (δηλαδή σε < 30 °C) και το άμεσο ηλιακό φως.

Polyram® WG

**Metiram (μετράμ)
Εναιωρηματοποιησιμοι Κόκκοι (WG)**

Εγγυημένη σύνθεση:
Metiram 70% β/β (ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)
Βοηθητικές ουσίες 16,7 % β/β

**Οργανικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση
κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μην αναπνέετε σκόνη.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
- Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ



Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 60316/4-4-2012

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:**

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860100,
www.basf-agro.gr



81136634 GR 1099

® = Σήμα κατατεθέν BASF

Περιεχόμενο:

1 kg



4 041885 029232