

SEQUESTRENE GREC/4X 1KG BOX



Sequestrene®
138 Fe NK 100 SG

syngenta®

Εγγυημένη σύνθεση:
Χηλικός σίδηρος EDDHA NaFe
περιεκτικότητας 5,5%
κατ' ελάχιστον.
Οξείδιο του καΐθου 15% min.
Άζωτο από ουρία 3% min.
Χλώριο 17% (3-0-15)

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

**Λίπασμα EK για
την αντιμετώπιση
τροφопενιών σιδήρου
σε όδους τους τύπους
εδάφους.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
της συσκευασίας**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Α. Ανθοπούλου, Ανθοπούλου Αετικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

SEZ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε.: Θ. Ένδρος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked © or ™ are ALLIANCE FRANCHISE
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE logo
are Trademarks of Syngenta Group Company

1 kg e

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



• Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική
δερματική
αντίδραση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μην τρώτε, πίνετε ή
καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.

• Να φοράτε προστατευτικά
γάντια. • Μην χρησιμοποιείτε
δόσεις μεγαλύτερες από τις
συνοσυσταμμένες, ιδιαίτερα
στους φυλλοψεκασμούς.

• Εφαρμογή στο έδαφος
συνήθως με τις οδηγίες δεν
παρουσιάζει κανένα κίνδυνο
για τα φυτά.

• Αποφύγετε επαφή με το
δέρμα.

• Καθαρίζετε καλά τα δοχεία
ανάμειξης και εφαρμογής του
SEQUESTRENE. Είναι ελαφρά
διαβρωτικό για τα μέταλλα
αν μαζί για πολύ σ' επαφή
μαζί τους.

• Καταστρέψτε τα κενά
μέσα συσκευασίας με πίεση
ή τρίπημα. Η χρήση τους
για οποιοδήποτε σκοπό
είναι επικίνδυνη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση επαφής με το
δέρμα: Πλύνετε με αφρόνο
νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση διήλητπρσίας
καλέστε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει
γνωστό αντίδοτο.

Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡ. ΔΗΛΗΤΗΡ.:
210 9737777

Για να αποφύγετε
κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το
πεβάλλον, ακολουθείστε
τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Οι δόσεις εξαρτώνται από το μέγεθος και την ανάπτυξη των φυτών, την ένταση της κλιματικής και τη σύσταση του εδάφους. Οι μεγάλες δόσεις είναι για πολύ αναπτυγμένα φυτά, για κλιματικές (κτρινήματα) βαριάς μορφής και για βαριά αδιαπεράστα εδάφη. Οι μικρές δόσεις είναι για μικρά φυτά, κλιματικές ελαφριάς μορφής ή για προληπτικές εφαρμογές και για πολύ διαπερατά εδάφη, που απαιτούν πολλά ποτίσματα. Σ' αυτά τα εδάφη συστήνεται αντί μιας εφαρμογής, να γίνονται 3 ή και 4 διαδοχικές εφαρμογές μέσα στη χρονιά συνδυασμένες με τα ποτίσματα.

Αμπελιές: 5 γρ./φυτό κατά τη φύτευση ή 20-50 γρ./πρέμνο με περίπου 10 κιλά νερό σε ανεπτυγμένη καλλιέργεια.

Πυρηνόκαρπα: Ροδάκινα, Βερυκοκιές: 50-150 γρ./δέντρο με 10-15 κιλά νερό.

Μηλοειδή: Αχλαδιές και Μηλιές: 100-300 γρ./δέντρο με 10-15 κιλά νερό.

Εσπεριδοειδή: Μικρά: 50-100 γρ./δέντρο. Μέτρια: 100-150 γρ./δέντρο.

Μεγάλα: 150-250 γρ./δέντρο. Η εφαρμογή γίνεται με 10-25 λίτρα νερού ή άμεση ενσωμάτωση.

Φυτάρια δέντρων: γενικά 5-8 γρ./δενδρύλιο με 10-25 λίτρα νερού ή άμεση ενσωμάτωση.

Καλλιωπιστικά - Ανθοκομικά: Σε γλάστρες (Γαρδένια, Χρυσάνθεμα, Μηνόνια κ.ά.) σε ήδη υγρό χώμα ρίξτε διάλυμα Sequestrene 1 γρ./κιλό νερό. Στην Ορτανόια 5 γρ./κιλό νερό. Σε βαριά προσβολή εναποθέστε μετά από 8 ημέρες.

Σε τριαντοφυλλίες: 3-5 γρ./φυτό ή 10-20 γρ./m², καθολικά.

Σε καλλιωπιστικούς θάμνους: Ιαζαλέες, ροδόδεντρα, ορτανόιες: 10-20 γρ./φυτό, με το νερό ποτίσματος.

Σε καλλιωπιστικά δέντρα: 50-100 γρ./φυτό ομοίως. Μεγάλη καλλιέργεια: Αραχίδα: Φυλλοψεκασμοί με διάλυμα 5% Sequestrene + διαβρέκτα σε ποσότητα 30 λίτρα νερό /στρέμμα, 1-2 ραντίσματα.

Λαχανικά: ριζοτόπια με 50-100 γρ. διαλύματος 2% (2 γρ. στο κιλό νερό), σε κάθε ρίζα, πριν από το πότισμα.

Για καθολική εφαρμογή: (σ' όλη την επιφάνεια) συστήνεται μια μέση δόση 5 γρ./τετρ. μέτρο εδαφικής επιφάνειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Να καταμίεμε τη δόση έτσι, ώστε να επωφεληθεί όλο το ριζικό σύστημα των φυτών, π.χ.: Διαλύστε τη δόση σε 10-15 κιλά νερό. Αναίξτε αυθαίς κυκλικό στα όρια της φυλλώσας και διανεμήτε το διάλυμα ομοιόμορφα. Σκεπάστε το αυθαίς αμέσως και ποτίστε, μετά, κανονικά.

Αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε μεμονωμένα φυτά. Σε αδιαπεράστα ή δυσκολοκατέργαστα εδάφη, μπορείτε, για ευκολία, να κάνετε το ίδιο (για δέντρα και μεγάλους θάμνους) με έγκυση στο έδαφος, χρησιμοποιώντας δηλ. ποσά ή ειδικούς εκχυτήρες (2 τρύπες, τουλάχιστον, ανά τετρ. μέτρο). Σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής εφαρμόστε διαλυμένο το αναγκαίο Sequestrene, ή σε αυθαίς - σε γραμμικές φτσίσεις - στις δύο πλευρές της κάθε γραμμής, ή σ' όλη την επιφάνεια. Σκεπάστε το αμέσως με αδύρο ή άλλο μέσο και ποτίστε. Στα αμπελιώδη που ελιθακύνονται, εφαρμόστε το Sequestrene, στους λάκκους λίγο πριν την ισοπέδωση του αμπελιώδου. Εφαρμογή στο Φυλλώμα δεν συστήνεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα: 50-100 γρ./100 κιλά νερό (όχι περισσότερο, ιδίως στα κλιματικά φυτά). Το καλύτερο αποτέλεσμα θα το έχετε όταν η πρώτη εφαρμογή γίνει με την έναρξη της βλάστησης (στα οπωροφόρα μετά την άνθηση).

Γενικά ίσως χρειαστούν 3-4 ραντίσματα ανά 15 ημέρες. Δεν είναι κατάλληλο για καλλιέργειες ευαίσθητες στο χλώριο.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που περιέχουν βαριά μέταλλα δεν πρέπει να ανακατώνονται με το Sequestrene.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΙΩΣΗΣ:

Στην αρχική του συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, και σε θερμοκρασία μέχρι 35 °C.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Στα δενδρώδη φυτά να εφαρμόζετε το Sequestrene στο τέλος του χειμώνα για να επωφεληθούν τα φυτά στο σκέρασμα από την παρουσία του.

Στα βαριά εδάφη νεώτερα, Στα φυλλοβόλα, να φροντίζετε να σημαδεύετε από τον προηγούμενο χρόνο τα δέντρα που πάσχουν από έλλειψη σιδήρου (κτρινοφυλλία).

