

ΤΖΙΜΠΑΛ:

Το γίββερέλλικό οξύ είναι μια φυσική ορμόνη των φυτών, που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης, διεγείροντας τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων με αποτέλεσμα να οδηγεί σε αυξημένη καρπώδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι του σημείου απορροής ή στοχευμένοι ψεκασμοί.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαραίτητη ποσότητα αυτού του προϊόντος σε λίγο νερό, σε ξεχωριστό δοχείο και προσθέστε το διάλυμα στη δεξαμενή. Ξεπλύνετε το δοχείο στη δεξαμενή. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε το εξοπλισμό ψεκασμού λεπτομερώς. Στραγγίστε το σύστημα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη δεξαμενή ψεκασμού, τη βέργα και τα ακροφύσια δύο έως τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

ΚΑΛΥΠΤΕΡΙΕΣ-ΣΤΟΧΕΙ-ΔΟΣΕΙΣ (γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΧΛΑΔΙΑ: Για αύξηση της καρπώδεσης και διέγερση της φυσιολογικής ανάπτυξης του καρπού. Δόση: **12 (1,2 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Έναρξη στα 20-30% της άνθησης έως τέλος άνθησης (ΒΒCH 62-69). **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια):** α) Για αύξηση του μήκους των τρυανών. Δόση: **30-100 (3-10 δισκία)** με 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστούς μήκους 4-8 εκ. (ΒΒCH 53-57). β) Αράωια. Δόση: **30-50 (3-5 δισκία)** με 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στο 30-40% της άνθησης (ΒΒCH 62-64). γ) Για αύξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοιογένεια της παραγωγής. Δόση: **30-50 (3-5 δισκία)** με 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την καρπώδεση μέχρι διάμετρο ράγας 3-4 χιλ. (ΒΒCH 71-79). δ) Για αύξηση της καρπώδεσης και πρωίμηση της ογκομυθρίας. Δόση: **30 (3 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση (70% πτώση των πετάλων, ΒΒCH 65) και 5-12 ημέρες αργότερα. **ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιησια σταφύλια):** Για αύξηση του μήκους των τρυανών. Δόση: 5 (0,5 δισκία) με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστούς μήκους 10-15 εκ. (ΒΒCH 53-57) **ΑΜΠΕΛΙ (για παραγωγή σταφίδας):** α) Για αύξηση του μεγέθους της ράγας. Δόση: **10 (1 δισκίο)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Μέγεθος ράγας 3 χιλ. (ΒΒCH 79). β) Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών. Δόση: 5 (0,5 δισκία) με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση (ΒΒCH 65). **ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ:** Για βελτίωση της ποιότητας του φρούτου. Δόση: **20 (2 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών (ΒΒCH 79-81). **ΜΑΝΤΙΝΙΑΡΙΑ:** Για διέγερση της καρπώδεσης. Δόση: **10 (1 δισκίο)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την πλήρη άνθηση έως στα 2/3 της πτώσης των πετάλων (ΒΒCH 65-73). **ΛΕΜΟΝΙΑ:** Για καθυστέρηση της ογκομυθρίας, μείωση του αριθμού των μικρών καρπών και αύξηση του μεγέθους των καρπών. Δόση: **20 (2 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών (ΒΒCH 76-79). **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Για πρωίμηση της παραγωγής και καλύτερη ποιότητα. Δόση: **20-50 (2-5 δισκία)** με 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Ο πρώτος ψεκασμός κατά τον χρωματισμό του κεντρικού άνθους (ΒΒCH 11-19).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητικό περίοδο-Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Αχλαδί-Πορτοκαλί-Λεμόνι-Αμπέλι/οινοποιησια σταφύλια (1), Αμπέλι/επιτραπέζια σταφύλια: Για αύξηση του μήκους των τρυανών & για αράωια (1*), Αμπέλι/επιτρα-

πέζια σταφύλια: Για αύξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοιογένεια της παραγωγής (2 / 8 ημέρες!), Αμπέλι/επιτραπέζια σταφύλια: Για αύξηση της καρπώδεσης και πρωίμηση της ογκομυθρίας (2 / 5 ημέρες!), Αμπέλι/για παραγωγή σταφίδας: Για αύξηση του μεγέθους της ράγας (1*), Αμπέλι/για παραγωγή σταφίδας: Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών (1*), Μαντινιάρια (2 / 7 ημέρες), Αγκινάρα (3 / 15 ημέρες!).

Παρατηρήσεις:

1) Άσπερες, ποικιλίες (Ισουλτάνια, Thompson,...) 2) Σουλτάνια. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή για καλή κάλυψη των σταφυλιών. Ψεκασμός κατά τις κρίσιμες ώρες της ημέρας. Ένα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. 3) Σουλτάνια. Ψεκασμός κατά τις κρίσιμες ώρες της ημέρας. Ένα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. 4) Μούρη Κορινθιά. Ψεκασμός κατά τις κρίσιμες ώρες της ημέρας. Ένα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. 5) Η αζωτοποίηση λίθων και η άρδευση θα πρέπει να αυξηθεί. Ψεκασμός κατά τις κρίσιμες ώρες της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΤΟΜΙΑ:

Όλες οι καλλιέργειες: Δεν απαιτείται.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΞΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες του φύλλου.



ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε Ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Επίσης, παραμένει σταθερό μετά από οκτώ (8) εβδομάδες αποθήκευσης στους 40°C.

Gibbal[®] ST

Gibberellic acid (Γίββερέλλικό Οξύ) 10%
Υδατοδιαλυτά Δισκία (ST)

Φυσική ορμόνη των φυτών που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης για αυξημένη καρπώδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Gibberellic Acid10% β/β
Βοηθητικές ουσίες ...89,25% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.Α.: 8277/24.04.2018

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

100 GRAMM. (10 x 10 ΓΡ.)



Κάτοχος της Άδειας: L.Gobbi srl.
16121 Genova, Italy

Υπεύθυνος για την τελική διείσδυση στην αγορά:

ΦΥΤΟΡΓΚΑ ΑΒΕΕ

Περίβολος 6 και Χρυσάποτο, 145 64, Κηφισιά Αττικής
Τηλ.: 2106252600

Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: +2111205555, Φαξ: 2111205559

Βεσσαλίονη, Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάνια

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου/περιερίστη σύμφορα με την εθνική νομοθεσία. Οι ερπύδες θα πρέπει να φορούν μακρι παντελόνι και μακρύμυλο ποκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται υπό πλεον ή ψιγέλι τριπλή ξεπλύματα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστράφουν προηγούμενος για την διασφάλιση της μη περαιτέρω δράσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση εναλλογής.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα συσκευασίες του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.

Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερού από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.

Για να αποφυγείτε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν οφθαλμικές ασηρές, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι ευκόλο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός,** συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. **Εισπνοή:** Σε περίπτωση εισπνοής των αεραβυθισμάτων, μετακινήστε το άτομο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή είναι αναπνευστική, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** απομακρύνετε τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το φάρμακο. Ξεπλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε. Εάν ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμένει. **Κατάποση:** Ξεπλύνετε το στόμα, πίνετε νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωατικά έπερα. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**