

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε να αναπνεύσετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, μην πινείτε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/προσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μαζέψτε τη χυμώδη ποσότητα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες:** Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αραιώστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλυνθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά για να εξασφαλιστεί καλό ξέπλυμα. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 210793777

ΜΗ ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: - 30m + ζώνη βλάστησης 20m για τα καλλωπιστικά δέντρα - 30m + ζώνη βλάστησης 20m για τα εσπεριδοειδή, - 25m + ζώνη βλάστησης 20m για τα μηλοειδή - 20m + ζώνη βλάστησης 20m για τα καλλωπιστικά με ύψος μεγαλύτερο από 50εκ., - 10m + ζώνη βλάστησης 10m για τα πυρηνόκαρπα και τα καλλωπιστικά με ύψος μικρότερο από 50εκ., -12m + ζώνη βλάστησης 10m για την ελιά, - 5m για τα λαχανικά.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μην το εφαρμόζετε κατά την άνθηση των καλλιέργειών όταν χρησιμοποιείτε δόση μεγαλύτερη από 75 κ.εκ./ στρέμμα ή όταν υπάρχουν μελιτώδη εκκρίματα.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει ργγίροχγφεν σε εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μεχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. **Συνδυαστικότητα:** Να μη συνδυάζεται με άλλα προϊόντα. **Τελειούσια επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή: 28 μέρες, ροδικανιά, νεκταρινιά, δαμοσκηνιά: 14 μέρες, Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι, φράουλα: 3 μέρες, λοιπές καλλιέργειες: καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενας με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από πηγές θερμότητας, σε χώρο ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια



ΥΓΡΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΕC)

Εγγ. σύνθεση: ργγίροχγφεν (πυριπροξυφέν) 10 % β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 88,79% β/β

Αρ. άδειας διάθεσης: 14562 / 5.04.16

Εντομοκτόνο,  
μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ.** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και δειξίωσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο:  
1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της άδειας:  
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS  
Parc d'affaires de Crecy,  
10A rue de la Voie Lactee,  
69370 SAINT DIDIER AU MONT D' OR,  
Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση  
στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρσάκι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900  
ΒΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9  
e-mail: info@hellafarm.gr

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλί, μανταρινιά, λεμονιά, φράπα, γκρεπ-φρουτ, άλλα είδη):** καταπολέμηση κοκκοειδών (π.χ. *Saissetia oleae*, *Lepidosaphes beckii*, *Insulaspis gloverii*, *Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus nerii*, *Parlatoria pergandei*) με δόση 35-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 200-300 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** καταπολέμηση κοκκοειδών (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Quadraspidiotus pyrri*, *Quadraspidiotus spp.*, *Pseudococcus spp.*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Lepidosaphes ulmi*, *Epidiaspis leperii*) με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80-100 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. **Ροδικανιά, νεκταρινιά, δαμοσκηνιά:** καταπολέμηση κοκκοειδών (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Eulecanium sp.*, *Eulecanium persicae*, *Epidiaspis leperii*) με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80-100 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. **Βερικοκιά, κερασιά, άλλα είδη πυρηνόκαρπων:** καταπολέμηση κοκκοειδών (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Eulecanium sp.*, *Eulecanium persicae*, *Epidiaspis leperii*) με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80-100 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. **Ελιά:** καταπολέμηση λεκανίου με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100-125 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς. **Αμπέλι:** καταπολέμηση κοκκοειδών (*Pulvinaria vitis*, *Planococcus citri*, *Planococcus ficus*, *Pathenolecanium corni*, *Heliothrips bohemicus*) με δόση 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 40-80 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.

**Τομάτα & μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου), πιπεριά θερμοκηπίου, αγγούρι, αγγουράκι & κολοκυθάκι θερμοκηπίου:** καταπολέμηση αλευρωδών (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) με δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100-150 λίτρα/στρέμμα. Δύο ψεκασμοί, ο 1ος με την εμφάνιση των πρώτων ακμιαίων και ο 2ος μετά από 10-15 μέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία (10 μέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 25 °C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη). **Φράουλα θερμοκηπίου:** καταπολέμηση αλευρωδών (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) με δόση 25-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80 - 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστη δόση 25 κ.εκ./ στρέμμα. Δύο ψεκασμοί, ο 1ος με την εμφάνιση των πρώτων ακμιαίων και ο 2ος μετά από 8 μέρες. **Βαμβάκι:** καταπολέμηση αλευρωδών (*Bemisia tabaci*) με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα και ψεκαστικό όγκο 40-80 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν το άνοιγμα των καρδιών και με την εμφάνιση των πρώτων ακμιαίων. **Καλλωπιστικά φυτά (ανθοφόρα και σε γλάστρα), τριανταφυλλιά, δέντρα, θάμνοι:** καταπολέμηση κοκκοειδών και αλευρωδών (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) με δόση 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστη δόση 112.5 κ.εκ./ στρέμμα. Για τα κοκκοειδή, ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. Για τους αλευρωδείς δύο ψεκασμοί, ο 1ος με την εμφάνιση των πρώτων ακμιαίων και ο 2ος μετά από 14 μέρες. **Πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών:** καταπολέμηση *Marchalina hellenica* με δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο ικανό για καλή διαβροχή των προσβεβλημένων μερών. Ένας ψεκασμός όταν έχει εκκολληθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών και με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δε θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.

**Παρατηρήσεις:** 1. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμιαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του ADMIRAL 10 EC. 2. Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της *Parlatoria oleae*. 3. Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί: - Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας -**Τρόπος εφαρμογής:** ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το *Marchalina hellenica* μερών των πευκών. **Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου.- Απαγορεύσεις:** Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών. Το σκεύασμα να μην εφαρμόζεται κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινα περιβάλλοντα. - **Περιορισμοί προφυλάξεως:** Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό. Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πευκών, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων. Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση για την εντόμηση *Marchalina hellenica* σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται: **α.** Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφυλάξεως για την ασφαλή χρήση του. **β.** Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

**Τρόπος δράσης:** Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (κοκκοειδή, αλευρωδείς και γενικά μηλίτικα έντομα). Μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμιαίο) παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωση τους. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Ειμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το προσθέτουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό συνεχίζοντας την αναδέυση.

**Καθαρμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορριπτικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους. Λάβετε όλα τα μέτρα προφυλάξεως.