Laracni® 1,8EC

Abamectin (Αμπαμεκτίν) 1,8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εντομοκτόνο ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Abamectin .....1,8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες .....97,8% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Α.Α.Δ.Α.: 14652/11.04.2018

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κάτοχος της Άδειας:
LAINCO S.A.
Pol. Ind. Can Jardi, Avda. Bizet, 8-12
08191 Rubi, Barcelona, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μακρυά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και τον ψεκασμό.
Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα: •10 μέτρων, σε αμπέλι, •15 μέτρων, σε πορτοκαλιά, •20 μέτρων, σε μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά και νεκταρινιά.
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από ακαλλιέργητες εκτάσεις: •5 μέτρων, σε αμπέλι, •10 μέτρων, σε πορτοκαλιά, μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά και νεκταρινιά.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου θα πρέπει να περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος και την εξαπόλυση εντόμων επικονίασης στα θερμοκήπια και 14 ημέρες για την εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΛΑΡΑΚΝΙ:
Εντομοκτόνο ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία, σε διάστημα 3-5 ημερών από τον ψεκασμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό δοχείο την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Φυλλοκνίτης. Δόση: **40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (30-80 κ.εκ./στρ.). Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών, Παραμορφωτικό άκαρι. Δόση: **40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (40-80 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής (κατά τη βλάστηση και κατά το δέσιμο των καρπών). ***ΜΗΛΙΑ:*** Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος. Δόση: **80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (60-96 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. ***ΑΧΛΑΔΙΑ:*** Ψύλλα. Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (37,5-120 κ.εκ./στρ.). Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος. Δόση: **80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (60-96 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση, με την εμφάνιση της προσβολής. ***ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:*** Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, *Bryobia rubrioculus*. Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (50-120 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. ***ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμα σταφύλια):*** Κίτρινος τετράνυχος. Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (25-100 κ. εκ./στρ.). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (να μην εφαρμοσθεί κατά την άνθηση). ***ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια, εκτός από Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα):*** Κίτρινος τετράνυχος. Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (50-120 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (να μην εφαρμοστεί κατά την άνθηση). ***ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ):*** Κίτρινος τετράνυχος, *Phytonemus pallidus*. Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (15-100 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Λιριόμυζα. Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (15-100 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. ***ΤΟΜΑΤΑ (Υ):*** Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (15-100 κ.εκ./στρ.). Κίτρινος τετράνυχος, *Polyphagotarsonemus latus*. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Λιριόμυζα. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. ***ΤΟΜΑΤΑ (Θ):*** Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (15-100 κ.εκ./στρ.). Κίτρινος τετράνυχος, *Eriophyidae, Polyphagotarsonemus latus*. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Λιριόμυζα. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. ***ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ):*** Κίτρινος τετράνυχος. Δόση: **50-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (15-80 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. ***ΚΟΛΟΚΥΘΗ (Θ)-ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ)-ΓΑΛΑΚΤΟΥΡΑΚΙ (Θ)-ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ)-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ):*** Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (15-100 κ.εκ./στρ.). Κίτρινος τετράνυχος. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Λιριόμυζα. Εφαρμογές με τον εμφανίσεις της προσβολής. ***ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ)-ΑΛΛΑ ΣΑΛΑΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Λυκοτρίβολο-Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια-νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένης της κράμβης) που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου):*** Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** (15-100 κ.εκ./στρ.). Τετράνυχοι, *Polyphagotarsonemus latus*. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Λιριόμυζα. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Πορτοκαλιά (100-200), Μηλιά-Αχλαδιά (75-120), Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια, εκτός από Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα) (100-120), Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια) (50-100), Φράουλα (Θ)-Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Κολοκύθι (Θ)-Αγγούρι (Θ)-Αγγουράκι (Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Κολοκύθα (Υ+Θ)-Μαρούλι (Υ)-Άλλα σαλατικά (Υ) (30-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
Πορτοκαλιά-Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Μαρούλι (Υ)-Άλλα σαλατικά (Υ) (1 / 3-7 ημέρες), Μηλιά-Αχλαδιά (1 / 2-15 ημέρες), Φράουλα (Θ)-Κολοκύθι (Θ)-Αγγούρι (Θ)-Αγγουράκι (Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Κολοκύθα (Υ+Θ) (1 / 2-7 ημέρες), Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Αμπέλι (1).

Παρατηρήσεις: Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: •Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας«. •Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με ακαρεοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΟΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Ροδακινιά, Νεκταρινιά: **14 ημέρες**.
Πορτοκαλιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες), Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες, εκτός από Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα): **10 ημέρες**.
Μαρούλι υπαίθρου, Άλλα σαλατικά υπαίθρου (Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια, Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένης της κράμβης) που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου): **7 ημέρες**.
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ): **5 ημέρες**.
Μηλιά, Αχλαδιά, Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ), Φράουλα (Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Κολοκύθι (Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ): **3 ημέρες**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αερίζόμενο, μακρυά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

01/2018-5