

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Να μην εφαρμόζεται με επινόητο ψεκαστήρα. • Μην εισέρχετε σε ψεκασμένη περιοχή αν δεν περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από τον ψεκασμό. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που λερώθηκαν με το προϊόν. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλυθείτε καλά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα κρατώντας τα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό αν τα συμπτώματα επιμένουν. Σε περίπτωση εισπνοής, εισπνεύστε καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό αν εμφανιστούν συμπτώματα. Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλέστε εμετό μόνο εάν ο παθών διατηρεί τις αισθήσεις του πλήρως. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
ΧΗΜΩΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν αλουμίνιο (π.χ. μυκητοκτόνα με βάση το fosetyl-Al) και σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και μαγνήσιο. Επίσης δεν συνδυάζεται με εναιωρήματα του Wuxal (υγρό λίπασμα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 28°C, προστατευμένο από το άμεσο φως. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

Αριθμός παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



BASF
The Chemical Company

Scala® 40 SC

Pyrimethanil (Πυριμεθανίλ) Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyrimethanil 40% β/ο (ανιλινοπυριμιδίνες)

Xi

Βοηθητικές ουσίες 61,66% β/β



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Agro B.V., Ελβετία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος, Θεσσαλονίκη. ©Σήμα κατατεθέν BASF.

021301α

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του βοτρυτή του αμπέλιου, της τομάτας, του αγγουριού και του φουζικλαδίου της μηλιάς.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- Ερεθίζει τα μάτια.
- Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
- Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 68037/4-2000

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 750 κ.εκ.

ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των «ανιλινοπυριμιδίων» με απολαστική και διελασματική κίνηση και σε βάθος δράση. Εμφανίζει αξιολογία προληπτική καθώς και δράση με αμύδι. Δρα εναντιόν του βοτρυτή του αμπέλιου, της τομάτας, του αγγουριού και του φουζικλαδίου της μηλιάς παρεμποδίζοντας την έκκριση υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες, τα οποία είναι απαραίτητα για την λύση των ιστών του κυτταρικού τοιχώματος του φυτού-ξενιστή, επιδρώντας έτσι στη διαδικασία παθογένεσης και κατά συνέπεια στην προσβολή των φυτών από τους μύκητες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί κανονικού όγκου διαβρέχοντας καλά τα μέρη που πρέπει να προστατευτούν. Να μην εφαρμόζεται με επινόητο ψεκαστήρα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μηλιά: Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*). Δόση: 50-75 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-200 λίτρα/στρέμ. Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από την πράσινη κορυφή μέχρι την πλήρη άνθηση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2. Αμπέλι: Βοτρυτής (*Botrytis cinerea*). Δόση: 150-200 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμ. Προληπτικές εφαρμογές από την άνθηση μέχρι την ωρίμανση. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανεθκτικότητας συνιστάται για κάθε 3 διαδοχικούς ψεκασμούς που γίνονται στην πράξη μόνο ο ένας να γίνεται με Scala 40 SC. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3. Τομάτα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Βοτρυτής (*Botrytis cinerea*). Δόση: 150-200 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμ. Εφαρμογές που ξεκινούν πριν την άνθηση μέχρι την ωρίμανση, με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. Αγγούρι (Θερμοκηπίου): Βοτρυτής (*Botrytis cinerea*). Δόση: 150-200 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμ. Εφαρμογές που ξεκινούν πριν την άνθηση μέχρι την ωρίμανση, με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
- Οι εφαρμογές στην τομάτα και στο αγγούρι είναι προληπτικές και γίνονται οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΘΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανεθκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με SCALA 40 SC να γίνονται σε συνδυασμό ή εναλλαγή με μη εκλεκτικά μυκητοκτόνα (μυκητοκτόνα επαφής) ή εκλεκτικά μυκητοκτόνα που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανεθκτικότητα με εκείνα της ομάδας των ανιλινοπυριμιδίων στην οποία ανήκει το pyrimethanil.

- Συνεχόμενες εφαρμογές με μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλινοπυριμιδίων, όπως pyrimethanil, cyprodinil ή metapyrithin δεν πρέπει να γίνονται στην ίδια καλλιέργεια ανά καλλιεργητική περίοδο.

- Οι εφαρμογές με SCALA 40 SC να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες και εμφανίζουν διαφορετικό τρόπο δράσης από το pyrimethanil.

- Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετικά μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλινοπυριμιδίων στην ίδια καλλιέργεια και καλλιεργητική περίοδο, ο συνολικός αριθμός των εφαρμογών με μυκητοκτόνα που περιέχουν pyrimethanil, cyprodinil ή metapyrithin δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Η αναδευση συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: • Μηλιά: 28 ημέρες. • Αμπέλι: 35 ημέρες. • Τομάτα υπαίθρου: 3 ημέρες • Τομάτα θερμοκηπίου: 3 ημέρες • Αγγούρι θερμοκηπίου: 3 ημέρες.