



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

#### ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

# Assist® 100EW

Cypermethrin (Συπερμεθρίν) 10%  
Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό

**Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου.**

#### ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Cypermethrin .....10% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες .....91,55% β/β

#### Προορίζεται μόνο για

επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.Α.: 14.571/24.06.2016

Αριθμός Παρτίδας: Ημερομηνία παραγωγής:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
--	---------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **200 Κ.ΕΚ.**



Κάτοχος της Άδειας: **SBM DEVELOPPEMENT**  
160, route de la Valentine, B.P. 90120,  
13371 Marseille cedex 11, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

#### Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση εισπνοής**, αναπνεύστε καθαρό αέρα.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα που έχει έλθει σε επαφή, με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση κατάποσης**, ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εάν η ποσότητα είναι μικρή, (όχι περισσότερο από μία μπουκιά), ξεπλύνετε το στόμα με νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Εάν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε ένα Κέντρο Υγείας και δείξτε το δεητίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα αν είναι δυνατόν.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**, πλύνετε τα κρατώντας τα ανοιχτά, με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

01/A/2018-5



**ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ**  
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΑΣΙΣΤ 100:** Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκάσμο φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Τριπλή ξέπλυμα.

#### ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο & Οινοποίηση):** Ευδεμίδα, Κοχυιλίδα, Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγος, Πυραλίδα. Δόση: **30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερίς, Πηλουτέλλα, Μαμέστρα, *Autographa sp.*, Αγρότις ή Καραφατμέ, Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Δορυφόρος, *Diabrotica spp.*, Τζιτζικάκια. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΠΑΤΑΤΑ:** Αφίδες, Δορυφόρος, *Phthorimaea operculella*. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΛΑΧΑΝΟ-ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ-ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ-ΓΟΓΓΥΛΙΑ-ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ:** Άητης, Δορυφόρος, Αλευρώδης, Αφίδες, *Diabrotica sp.*, Τζιτζικάκια, Θρίπες, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερίδα, Πηλουτέλλα, Μαμέστρα, *Autographa sp.*, Αγρότις ή Καραφατμέ. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Προνύμφες Λεπιδοπτέρων, Πράσινο ακουλήκι, Ρόδινο ακουλήκι, Ακανθώδες ακουλήκι, Διπάροψη, Αγρότις, Σποντόπτερα, Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπες. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ:** Αφίδες, Αγρότις. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Αφίδες. Δόση: **25 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΜΗΔΙΚΗ:** Προνύμφες Λεπιδοπτέρων, Φυτονόμος, Πράσινο ακουλήκι, Ρόδινο ακουλήκι, Ακανθώδες ακουλήκι, Διπάροψη, Αγρότις, Σποντόπτερα, Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπες. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΓΡΑΣΙΔΙ (ΓΚΑΖΟΝ):** Αλευρώδης, Αφίδες. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ρίγανη-Βασιλικός-Δυόσμος-Γιασεμί-Γλυκάνισος-Δάφνη-Δενδρολίβανο-Δίκταμο-Θυμάρι-Κάππαρη-Κορίανδρος-Κρόκος-Κύμινο-Λεβάντα-Μάραθος-Μαντζουράνα-Μελισσόχορτο-Μέντα-Μαιντανός-Ανιθος-Αρώνια-Χαμομήλι-Φασκόμηλο-Υσώπος-Σάββια-Τσάι βουνού-Τριανταφυλλιά (για αρωματοποίηση):** Αλευρώδης, Αφίδες. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΞΥΛΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** Αλευρώδης, Αφίδες. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):**

Αμπέλι-Τομάτα (Υ+Θ)-Βαμβάκι (50-100), Πατάτα-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο-Λαχανάκια Βρυξελλών-Κινέζικα Λάχανα-Γογγύλια-Σελινόριζα (40-100), Σιτάρι-Κριθάρι-Ελαιοκράμβη-Γρασίδι (Γκαζόν) (20-30), Μηδική-Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά (40-120), Ξυλώδη καλλωπιστικά (100-150).

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:**

Αμπέλι-Τομάτα (Υ+Θ)-Πατάτα-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο-Λαχανάκια Βρυξελλών-Κινέζικα Λάχανα-Γογγύλια-Σελινόριζα-Σιτάρι-Κριθάρι-Ελαιοκράμβη-Μηδική-Γρασίδι (Γκαζόν)-Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά-Ξυλώδη καλλωπιστικά (2), Βαμβάκι (1).

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ:**

Π.χ. διαχείριση ανθεκτικότητας, οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα, κ.λ.π. παρατηρήσεις: Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25°C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών. Το μείγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκαστικό μέσο.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Ελαιοκράμβη: **28 ημέρες.** / Σιτάρι-Κριθάρι: **21 ημέρες.**

Αμπέλι-Πατάτα-Βαμβάκι-Σελινόριζα-Μηδική: **14 ημέρες.**

Τομάτα (Υ)-Λαχανάκια Βρυξελλών-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο-Κινέζικα Λάχανα-Γογγύλια: **7 ημέρες.** / Τομάτα (Θ): **3 ημέρες.**

Γρασίδι (Γκαζόν)-Αρωματικά φυτά-Καλλωπιστικά-Ξυλώδη Καλλωπιστικά: **Δεν εφαρμόζεται.**

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:** Να αποθηκεύεται, καλά κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.