



Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Μην τρώτε, πίνετε ή καννίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και την εφαρμογή.

#### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατεύσετε τα φυτά μη στόχους, να αφιέρσετε μίαν αφέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

#### Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτό:

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής**, μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης**, καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

**Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δλητηρίασεων: 2107793777



# Dimbo® 480SL

## Dicamba (Ντικάμπα) 48% Πυκνό διάλυμα

### Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων ηλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

#### ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Dicamba .....48% β/ο

Βοηθητικές ουσίες .....58,41% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 70136/19.10.2015

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 600 Κ.ΕΚ.



Κάτοχος της Άδειας: Ghada Chemicals Limited  
Holbrook House, 72 Lower Addiscombe Road,  
Croydon CR9 6AD, Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάνια

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βιωτικής



#### ΝΤΙΜΠΟ:

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων ηλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα των ζιζανίων, μεταφέρεται σε όλο το φυτό και συσσωρεύεται στα μέρη όπου υπάρχει υψηλός μεταβολικός ρυθμός.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καθοδικός ψεκασμός με 25-30 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπλε τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μέχρι 3 ατμόσφαιρες.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του αραβόσιτου, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

#### ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:** Πηλατύφυλλα ζιζάνια(\*). Δόση: 50-75 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά, όταν ο αραβόσιτος έχει 2-6 πραγματικά φύλλα.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 25-30 λίτρα/στρέμμα.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθιεργητική περίοδος:** Μία (1) εφαρμογή.

#### Παρατηρήσεις:

**\*Καταπολεμώμενα ζιζάνια:** Αγριοτοματιά, Αγριοπεριδιά, Άγριο σινάπι, Αναρχικόμυνο πολύουνο, Ασπράγκανο, Ζωικός, Κίριοι, Λουβουδιά, Ποιχόκμυι, Πορφυρό ήλιμο, Τραχύ βήλιτο, Artiplex sp. \* Καταπολεμάται καλύτερα με τη μεγαλύτερη δόση. Ο ψεκασμός να γίνεται απούσα ανέμου. Αποφύγετε τη μεταφορά ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε βαμβάκι, σόγια, τομάτα, αγγούρι και μαρούφι.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ:** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια αραβόσιτου που προορίζεται για απορρυπαντική και σε γλυκό καθαμάκι.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορεί να σπείρει μόνον αραβόσιτος μετά από όργωμα.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

Σε προγράμματα αμειψισποράς, μετά τον αραβόσιτο, μπορεί να καλλιιεργηθεί οποιαδήποτε καλλιέργεια το φθινόπωρο ή την επόμενη άνοιξη, μετά από όργωμα.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (24 ώρες).

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε σβεστωδή εδάφη.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:** Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.