



# MOVENTO®

2XSYS 150 OD

## 250 ml e

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας Υ.Α.Α.Τ.:  
14.430/30.04.2013

**Ελαιώδες Εναιώρημα (OD)**

Εγγυημένη σύνθεση: spirotetramat 15% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 84,06% β/β

### ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

### ΠΡΟΣΟΧΗ



200

100

## MOBENTO 150 OD

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εντομοκτόνο, ανήκει στη νέα χημική ομάδα των τετραμικών οξέων και εμφανίζει νέο τρόπο δράσης (παρεμποδιστής βιοσύνθεσης λιπιδίων). Εμφανίζει δράση στομάχου στους εχθρούς-στόχους. Μετά την εφαρμογή το spirotetramat διεισδύει στα φύλλα και με τη διπλή διασυστηματική του δράση (ανοδική & καθοδική / ακροπέταλη & βασιπέταλη) μετακινείται σε ολόκληρο το φυτό. Επιδρά κυρίως στα ατελή στάδια, τα οποία παγιδούνται μεταξύ δύο εκδύσεων και θανατώνονται επειδή δεν μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης. Μειώνει επίσης την ικανότητα των θηλυκών εντόμων να αναπαραχθούν και τη βιωσιμότητα των απογόνων τους. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται νωρίς και έγκαιρα, προκειμένου να διεισδύσει το spirotetramat στα φυτά και να σταματήσει την εξέλιξη της προσβολής.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος με καλή κάλυψη/διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.

Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Αποφεύγετε το συνδυασμό του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ)**

**ΑΜΠΕΛΙ:** Ψευδόκοκκος (*Planococcus ficus*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης. 1η εφαρμογή όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού, 2η εφαρμογή όταν αρχίσει να «κλείνει» το τασιμί.

**Δόση:** 50 κ.εκ./στρέμμα (min-max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**Aphis spp.** Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40-50 κ.εκ./στρέμμα (min-max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΑΧΛΑΔΙΑ:** Ψύλλα Αχλαδιάς (*Cacopsila pyri*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης, όταν το 50% των αυγών είναι κίτρινα και το υπόλοιπο 50% λευκά. **Δόση:** 100\* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (\*με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα) (100-144 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**Ψώρα Σαν Ζοζέ<sup>1</sup>** (*Quadraspidiotus perniciosus*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης, στα ευαίσθητα στάδια

(κινητές μορφές). **Δόση:** 100\* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (\*με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα) (100-144 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**Ρόδινη αφίδα της μηλιάς** (*Dysaphis plantaginea*), **Πράσινη αφίδα της μηλιάς** (*Aphis pomi*): Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 60\* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (\*με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα) (60-90 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΜΗΛΙΑ:** **Ψώρα Σαν Ζοζέ<sup>1</sup>** (*Quadraspidiotus perniciosus*), **Lepidosaphes sp.**, **Ματόψειρα** (*Eriosoma lanigerum*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης, στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). Για τη Ματόψειρα, εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης με την εμφάνιση της προσβολής. Συστήνεται να γίνεται πολύ καλή διαβροχή. **Δόση:** 100\* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (\*με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα) (100-144 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**Ρόδινη αφίδα της μηλιάς** (*Dysaphis plantaginea*), **Πράσινη αφίδα μηλιάς** (*Aphis pomi*): Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 60\* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (\*με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα) (60-90 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** **Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς** (*Myzus persicae*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 60\* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (\*με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα) (60-90 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**Ψώρα του Σαν Ζοζέ** (*Quadraspidiotus perniciosus*), **Βαμβακάδα της ροδακινιάς** (*Pseudalacaspis pentagona*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης, στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 100\* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (\*με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα) (100-144 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΚΕΡΑΣΙΑ:** **Μαύρη αφίδα της κερασιάς** (*Myzus cerasi*). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 60\* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (\*με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα) (60-90 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά**

**καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14-21.

**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΙΠ-ΦΡΟΥΤ:** **Κοκκοειδή** (*Aonidiella* sp., *Planococcus* sp., *Aspidiotus* sp., *Ceroplastes* sp., *Parlatoria* sp., *Saissetia* sp., *Lepidosaphes* sp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης, στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 20-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-300 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/21.

**ΕΛΙΑ:** **Κοκκοειδή** (*Parlatoria* sp., *Lepidosaphes* sp., *Saissetia* sp.). Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). **Δόση:** 50 κ. εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο /Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/21.

**ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ. εκ./στρέμμα (min-max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*), **Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρέμμα (min-max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/14.

**ΠΕΠΟΝΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40 κ.εκ./στρέμμα (min-max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/14.

**Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρέμμα (min-max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/14.

**ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 40 κ.εκ./στρέμμα (min-max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρέμμα (min-max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** **Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), **Αφίδες** (*Myzus persicae*,

*Aphis gossypii*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50-100 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 75-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*), **Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/14.

**ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*), **Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50-100 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 75-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (40 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/14.

**Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/14.

**ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (40 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-75 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 4/14.

**ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ:** **Αφίδες** (*Brevicoryne brassicae*, *Aphis* spp.). Με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα (min-max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 25-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/14.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** <sup>1</sup> Στη μηλιά και την αγλαδιά να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση για την καταπολέμηση του *Quadraspidiotus perniciosus*.

## ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Αμπέλι, Αχλαδιά, Μηλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-Φρουτ, Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών, Ελιά: 2

Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Υ&Θ), Πεπόνι (Υ&Θ), Καρπούζι (Υ&Θ): 3

Τομάτα (Υ&Θ), Αγγούρι (Υ&Θ), Κολοκύθι (Υ&Θ): 4

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αχλαδιά, Μηλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά: 21 ημέρες.

Αμπέλι, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Ελιά: 14 ημέρες.

Τομάτα (Υ&Θ), Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Υ&Θ), Αγγούρι (Υ&Θ), Πεπόνι (Υ&Θ), Καρπούζι (Υ&Θ), Κολοκύθι (Υ&Θ), Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών: 3 ημέρες.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, η επόμενη καλλιέργεια μπορεί να φυτευτεί/σπαρθεί μετά από τριάντα (30) ημέρες.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

**Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης – Αρ. Παρτίδας:** Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

### Πρώτες Βοήθειες

#### Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

**Γενικά:** Απομακρύνετε τον πάσχοντα από την περιοχή κινδύνου και τοποθετείτε τον σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα βρεγμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

• **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Εάν ο ερεθισμός αναπτυχθεί και επιμένει, καλέστε αμέσως γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύντε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Δειξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

**Θεραπεία:** πρώτες βοήθειες, απομόλυνση, συμπτωματική θεραπεία.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

**Θεραπεία:** πρώτες βοήθειες, απομόλυνση, συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

## ΠΡΟΣΟΧΗ



### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. «Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο». • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες της Ελιάς και των Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρουτ). • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για τις καλλιέργειες της Ελιάς και των Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρουτ) και 5 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για τις καλλιέργειες των Μηλοειδών (Μηλιά, Αχλαδιά) και των Πυρηνόκαρπων (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά). • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

GR80235089C

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

**24/7**

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

# Bayer

Bayer Ελλάς ABEE

Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6166000 – Fax: 210 6109100

[www.bayercropscience.gr](http://www.bayercropscience.gr)







# MOVENTO®

2XSYS 150 OD

## 250 ml e

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας Υ.Α.Α.Τ.:  
14.430/30.04.2013

**Ελαιώδες Εναιώρημα (OD)**

Εγγυημένη σύνθεση: spirotetramat 15% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 84,06% β/β

## ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

### ΠΡΟΣΟΧΗ

